



Entwicklung des Gesamtüberlebens* - Magenkarzinom (C16)



Zeitraum	beob. Überl.	rel. Überl.	95%-KI ±	N	zens. %
1995 - 1999	20,9	26,0	2,6	927	1,7
2000 - 2004	21,0	26,0	2,5	988	1,5
2005 - 2009	21,4	27,1	2,8	804	2,1
2010 - 2014	25,1	31,6	3,1	748	10,4

mediane Überlebenszeit
 1995 - 1999 ,8 Jahre
 2000 - 2004 ,7 Jahre
 2005 - 2009 ,8 Jahre
 2010 - 2014 1,2 Jahre

nur Ersterkrankungen




Zeitraum	beob. Überl.	rel. Überl.	95%-KI ±	N	zens. %
1995 - 1999	19,0	24,2	3,4	518	1,5
2000 - 2004	18,9	23,5	3,3	528	1,7
2005 - 2009	22,8	28,3	3,9	438	2,3
2010 - 2014	21,1	26,4	4,0	411	5,8

mediane Überlebenszeit
 1995 - 1999 ,7 Jahre
 2000 - 2004 ,8 Jahre
 2005 - 2009 ,9 Jahre
 2010 - 2014 1,1 Jahre

nur Ersterkrankungen

Vergleichswert - - - , 5-Jahres-Überleben (%)
 RKI, BRD 2013-2014, niedrigster Wert, männlich 29,0
 RKI, BRD 2013-2014, höchster Wert, männlich 36,0
 RKI, BRD 2013-2014, mittlerer Wert, männlich 30,0



Zeitraum	beob. Überl.	rel. Überl.	95%-KI ±	N	zens. %
1995 - 1999	23,2	28,3	4,1	409	2,0
2000 - 2004	23,5	28,8	3,9	460	1,3
2005 - 2009	19,6	25,2	4,1	366	1,9
2010 - 2014	30,0	38,1	4,9	337	16,0


mediane Überlebenszeit
 1995 - 1999 ,8 Jahre
 2000 - 2004 ,6 Jahre
 2005 - 2009 ,8 Jahre
 2010 - 2014 1,4 Jahre

nur Ersterkrankungen

Vergleichswert - - - , 5-Jahres-Überleben (%)
 RKI, BRD 2013-2014, niedrigster Wert, weiblich 27,0
 RKI, BRD 2013-2014, höchster Wert, weiblich 36,0
 RKI, BRD 2013-2014, mittlerer Wert, weiblich 33,0

*Das Hauptziel der Diagnostik und Therapie von Tumorerkrankungen ist die Verhinderung des tumorbedingten Sterbens (relatives Überleben). Die Auswertungen sollen die Entwicklung (Trend) in den letzten Jahren demonstrieren. Die Ergebnisse sind immer ein Ausdruck des Dokumentationsstandes. Mit weiterem Fortschreiben der dokumentierten Daten werden die Ergebnisse entsprechend neu berechnet und somit der Aktualität angepasst. Frühere Diagnostik durch Vorsorgeuntersuchungen können ebenfalls einen positiven Einfluss auf das Gesamtüberleben haben.


Entwicklung des Gesamtüberlebens* - Magenkarzinom (C16)



Zeitraum	beob. Überl.	rel. Überl.	95%-KI ±	N	zens. %
1995 - 1999	58,2	72,8	7,0	194	3,1
2000 - 2004	63,4	74,8	6,6	202	4,0
2005 - 2009	63,7	76,7	7,8	146	4,8
2010 - 2014	59,6	74,2	9,7	99	25,3

mediane Überlebenszeit
 1995 - 1999 >5,0 Jahre
 2000 - 2004 >5,0 Jahre
 2005 - 2009 >5,0 Jahre
 2010 - 2014 >5,0 Jahre


nur Ersterkrankungen



Zeitraum	beob. Überl.	rel. Überl.	95%-KI ±	N	zens. %
1995 - 1999	31,6	38,3	9,1	101	2,0
2000 - 2004	34,0	40,5	9,1	103	1,9
2005 - 2009	33,7	41,4	9,8	89	,0
2010 - 2014	47,8	58,7	8,9	121	12,4

mediane Überlebenszeit
 1995 - 1999 1,9 Jahre
 2000 - 2004 3,1 Jahre
 2005 - 2009 3,7 Jahre
 2010 - 2014 >5,0 Jahre


nur Ersterkrankungen



Zeitraum	beob. Überl.	rel. Überl.	95%-KI ±	N	zens. %
1995 - 1999	14,9	18,1	5,8	147	,7
2000 - 2004	13,4	16,1	6,3	112	,9
2005 - 2009	19,1	24,1	8,0	94	3,2
2010 - 2014	24,3	29,0	7,1	145	9,0

mediane Überlebenszeit
 1995 - 1999 1,3 Jahre
 2000 - 2004 ,7 Jahre
 2005 - 2009 1,6 Jahre
 2010 - 2014 2,0 Jahre

nur Ersterkrankungen



Zeitraum	beob. Überl.	rel. Überl.	95%-KI ±	N	zens. %
1995 - 1999	1,7	2,0	.	352	,6
2000 - 2004	2,6	3,1	1,6	390	,5
2005 - 2009	3,1	3,8	1,8	352	1,1
2010 - 2014	5,1	6,2	2,6	276	3,6

mediane Überlebenszeit
 1995 - 1999 ,2 Jahre
 2000 - 2004 ,2 Jahre
 2005 - 2009 ,4 Jahre
 2010 - 2014 ,4 Jahre

nur Ersterkrankungen

verwendete Sterbetafel:
 Sachsen 1995-2018