

Entwicklung des Gesamtüberlebens* - Leukämien C91-95

Zeitraum	beob. Überl.	rel. Überl.	95%-KI ±	N	zens. %
1995 - 1999	46,2	53,4	4,9	391	2,6
2000 - 2004	47,1	55,2	4,3	528	1,3
2005 - 2009	52,4	62,4	4,2	534	2,1
2010 - 2014	54,8	66,3	4,1	581	14,1

mediane Überlebenszeit
 1995 - 1999 >5,0 Jahre
 2000 - 2004 >5,0 Jahre
 2005 - 2009 >5,0 Jahre
 2010 - 2014 >5,0 Jahre

nur Ersterkrankungen

Zeitraum	beob. Überl.	rel. Überl.	95%-KI ±	N	zens. %
1995 - 1999	49,3	57,2	6,6	219	2,3
2000 - 2004	51,4	60,2	6,1	257	1,2
2005 - 2009	51,7	61,6	5,8	286	2,1
2010 - 2014	57,1	69,7	5,5	311	15,4

mediane Überlebenszeit
 1995 - 1999 >5,0 Jahre
 2000 - 2004 >5,0 Jahre
 2005 - 2009 >5,0 Jahre
 2010 - 2014 >5,0 Jahre

Vergleichswert - - - - , 5-Jahres-Überleben (%)
 RKI, BRD 2013-2014, niedrigster Wert, männlich 51,0
 RKI, BRD 2013-2014, höchster Wert, männlich 68,0
 RKI, BRD 2013-2014, mittlerer Wert, männlich 59,0

nur Ersterkrankungen

Zeitraum	beob. Überl.	rel. Überl.	95%-KI ±	N	zens. %
1995 - 1999	42,4	48,5	7,4	172	2,9
2000 - 2004	43,2	50,0	5,9	271	1,5
2005 - 2009	53,2	62,7	6,2	248	2,0
2010 - 2014	52,2	62,1	6,0	270	12,6

mediane Überlebenszeit
 1995 - 1999 4,5 Jahre
 2000 - 2004 4,4 Jahre
 2005 - 2009 >5,0 Jahre
 2010 - 2014 >5,0 Jahre

Vergleichswert - - - - , 5-Jahres-Überleben (%)
 RKI, BRD 2013-2014, niedrigster Wert, weiblich 53,0
 RKI, BRD 2013-2014, höchster Wert, weiblich 65,0
 RKI, BRD 2013-2014, mittlerer Wert, weiblich 58,0

nur Ersterkrankungen

*Das Hauptziel der Diagnostik und Therapie von Tumorerkrankungen ist die Verhinderung des tumorbedingten Sterbens (relatives Überleben). Die Auswertungen sollen die Entwicklung (Trend) in den letzten Jahren demonstrieren. Die Ergebnisse sind immer ein Ausdruck des Dokumentationsstandes. Mit weiterem Fortschreiben der dokumentierten Daten werden die Ergebnisse entsprechend neu berechnet und somit der Aktualität angepasst. Frühere Diagnostik durch Vorsorgeuntersuchungen können ebenfalls einen positiven Einfluss auf das Gesamtüberleben haben.

Entwicklung des Gesamtüberlebens* - Leukämien C91-95

Leukämieart	relatives Überleben	Zeitraum	beob. Überl.	rel. Überl.	95%-KI ±	N	zens. %
Entwicklung des Gesamtüberlebens der ALL (C91.0) nur Ersterkrankungen		1995 - 1999	50,0	51,0	17,3	32	9,4
		2000 - 2004	36,8	38,3	.	38	2,6
		2005 - 2009	48,4	50,0	.	31	12,9
		2010 - 2014	45,2	48,8	.	31	16,1
		mediane Überlebenszeit		1995 - 1999	>5,0 Jahre		
	2000 - 2004	,8 Jahre					
	2005 - 2009	>5,0 Jahre					
	2010 - 2014	1,3 Jahre					
Entwicklung des Gesamtüberlebens der CLL (C91.1) nur Ersterkrankungen		1995 - 1999	59,2	69,2	7,0	191	1,0
		2000 - 2004	70,2	81,9	5,8	238	1,3
		2005 - 2009	71,6	86,0	5,5	261	1,5
		2010 - 2014	72,0	86,9	5,1	305	16,4
		mediane Überlebenszeit		1995 - 1999	>5,0 Jahre		
	2000 - 2004	>5,0 Jahre					
	2005 - 2009	>5,0 Jahre					
	2010 - 2014	>5,0 Jahre					
Entwicklung des Gesamtüberlebens der AML (C92.0) nur Ersterkrankungen		1995 - 1999	14,5	16,0	.	69	2,9
		2000 - 2004	13,8	16,0	6,5	109	1,8
		2005 - 2009	14,0	16,8	6,4	114	,0
		2010 - 2014	22,7	24,9	.	97	8,2
		mediane Überlebenszeit		1995 - 1999	,1 Jahre		
	2000 - 2004	,2 Jahre					
	2005 - 2009	,4 Jahre					
	2010 - 2014	,5 Jahre					
Entwicklung des Gesamtüberlebens der CML (C92.1) nur Ersterkrankungen		1995 - 1999	44,2	50,3	13,5	52	3,8
		2000 - 2004	44,4	50,4	.	45	2,2
		2005 - 2009	65,4	73,3	12,9	52	1,9
		2010 - 2014	67,4	76,9	13,5	46	21,7
		mediane Überlebenszeit		1995 - 1999	>5,0 Jahre		
	2000 - 2004	>5,0 Jahre					
	2005 - 2009	>5,0 Jahre					
	2010 - 2014	>5,0 Jahre					
verwendete Sterbetafel:		Sachsen 1995-2018					