


Durchschnittlich erfasste Erkrankungszahlen

Zeitraum	Geschlecht	N	rohe Rate	altersstandardisierte Rate (ESR)*	arithm. Alter Jahre	medianes Alter Jahre	Vergleich medianes Alter	Vergleichsquelle
2014 - 2018	männlich	1831	126,3	58,2	74,3	76,2	.	
	weiblich	1602	104,8	45,1	73,1	75,8	.	



* europastandardisierte Rate

Anzahl Neuerkrankungen



Absolute Neuerkrankungszahlen und Neuerkrankungsraten je 100.000 Einwohner

Jahr	absolut männlich	absolut weiblich	Rohe Rate männlich	Rohe Rate weiblich	Stand. Rate männlich	Stand. Rate weiblich
2019	478	455	167,1	151,3	77,5	65,0
2018	421	342	147,1	113,7	65,6	50,2
2017	392	326	136,0	107,4	61,5	43,9
2016	358	321	123,2	104,9	56,3	45,5
2015	339	320	115,6	103,7	53,4	44,7
2014	321	293	109,7	94,3	53,6	40,9
2013	285	257	97,1	82,2	51,0	39,0
2012	286	261	96,6	82,5	50,2	41,8
2011	244	259	81,6	81,1	43,3	40,6
Ø95-10	91	115	28,2	33,1	18,1	18,5



Vergleichswerte ----;

Vergleichswerte ----;





Klinisches Krebsregister Zwickau Erzgebirgskreis, Vogtlandkreis, Zwickau
In-situ-Neubildungen D00-09 ohne D06 und D09.0

Zahl der Neuerkrankungen nach Stadt-/Landkreisen

Klinisches Krebsregister Zwickau	absolut männlich					absolut weiblich				
	2019	2018	2017	2016	2015	2019	2018	2017	2016	2015
Erzgebirgskreis (anteilig 33,1%)	65	90	77	67	79	78	60	67	47	46
Vogtlandkreis	195	186	167	157	163	183	153	139	137	151
Zwickau (anteilig 78,3%)	218	145	148	134	97	194	129	120	137	123

Neuerkrankungsrate nach Stadt-/Landkreisen (n/100.000 Einwohner), altersstandardisiert (ESR)


Region	Stand. Rate männlich					Stand. Rate weiblich				
	2019	2018	2017	2016	2015	2019	2018	2017	2016	2015
Erzgebirgskreis	57,8	80,1	66,2	55,4	69,0	62,5	44,9	51,1	40,9	34,2
Vogtlandkreis	80,3	73,1	67,4	64,5	65,9	71,9	60,6	46,1	48,5	50,6
Zwickau	83,6	52,4	54,0	49,3	35,1	59,9	43,0	38,7	44,9	44,1




Klinisches Krebsregister Zwickau Erzgebirgskreis, Vogtlandkreis, Zwickau
In-situ-Neubildungen D00-09 ohne D06 und D09.0

Diagnosejahre
 2014 bis 2018

Neuerkrankungen/Jahr nach Altersgruppen




Neuerkrankungen/100.000 EW nach Altersgruppen



Verteilung der ICD10

ICD-10	Bezeichnung	m	%m	w	%w	ges.	%ges.
D00	Carcinoma in situ der Mundhöhle, des Ösophagus und des Magens	31	1,7	9	,6	40	1,2
D01	Carcinoma in situ sonstiger und nicht näher bezeichneter Verdauungsorgane	287	15,7	152	9,5	439	12,8
D03	Melanoma in situ	224	12,2	204	12,7	428	12,5
D04	Carcinoma in situ der Haut	1162	63,5	962	60,0	2124	61,9
D05	Carcinoma in situ der Brustdrüse [Mamma]	6	,3	217	13,5	223	6,5
D07	Carcinoma in situ sonstiger und nicht näher bezeichneter Genitalorgane	42	2,3	33	2,1	75	2,2
D09	Carcinoma in situ sonstiger und nicht näher bezeichneter Lokalisationen	49	2,7	21	1,3	70	2,0
sonst.	sonstige Erkrankungen	30	1,6	4	,2	34	1,0
	Gesamt	1831	53,3	1602	46,7	3433	.



In-situ-Neubildungen D00-09 ohne D06 und D09.0

Diagnosejahre
2014 bis 2018

Häufigkeit der Tumorerkrankungen nach der Lokalisation (ICD-O)

ICD-O	Bezeichnung	m	%m	w	%w	ges.	%ges.
C44	Haut	1386	75,7	1166	72,8	2552	74,3
C18	Kolon	183	10,0	103	6,4	286	8,3
C50	Brust [Mamma]	6	,3	217	13,5	223	6,5
C20	Rektum	88	4,8	38	2,4	126	3,7
sonst.	sonstige Lokalisationen	168	9,2	78	4,9	246	7,2
	Gesamt	1831	53,3	1602	46,7	3433	.


Histologische Häufigkeitsverteilung

Bezeichnung	M-Code	N	%	gesamt
M. Bowen	8081/2	2020	58,8%	58,8%
Melanoma in situ	8720/2	219	6,4%	6,4%
Lentigo maligna	8742/2	209	6,1%	6,1%
Adenocarcinoma in situ in adenomatösem Polypen	8210/2	206	6,0%	6,0%
Nichtinfiltrierendes intraduktales Karzinom o.n.A.	8500/2	201	5,9%	5,9%
Adenocarcinoma in situ o.n.A.	8140/2	190	5,5%	5,5%
Plattenepithel-Carcinoma in situ o.n.A.	8070/2	160	4,7%	4,7%
sonstige in situ Histologien		228	6,6%	6,6%
in situ Histologien gesamt		3433		100%

In-situ-Neubildungen D00-09 ohne D06 und D09.0

Therapien im ersten Jahr nach Diagnosenstellung

Jahr	OP+RTsT	OP+RT	OP+sT	RTsT	OP	sT	RT	k.A.*1	k.A.*2	gesamt	OP %
2014	4	28	1	0	521	0	1	59	0	614	84,9
2015	7	46	4	0	552	1	2	47	0	659	83,8
2016	5	26	3	0	580	2	5	58	0	679	85,4
2017	2	25	1	0	634	0	1	55	0	718	88,3
2018	0	32	0	1	269	2	0	459	0	763	35,3
gesamt	18	157	9	1	2556	5	9	678	0	3433	74,5
%	1	5	0	0	74	0	0	20	0	100	.



OP = Operation
sT = systemische Therapie
RT = Strahlentherapie
k.A. = keine Angabe

k.A.*1 = keine tumorspezifische Therapie, jedoch histologisch gesichert
k.A.*2 = keine tumorspezifische Therapie, nur klinische Sicherung des Tumors

Diagnosejahre
2014 bis 2018

Operationen im ersten Jahr nach Diagnosenstellung*

OPS	Anzahl	%	OPS-Schlüssel Version 2015
5-894	1789	65,3	Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut
5-452	226	8,2	Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes
5-870	203	7,4	Partielle (brusterhaltende) Exzision der Mamma und Destruktion von Mammagewebe
5-895	147	5,4	Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut
5-212	116	4,2	Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Nase
5-181	86	3,1	Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des äußeren Ohres
5-455	72	2,6	Partielle Resektion des Dickdarmes
5-482	63	2,3	Perianale lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Rektums
5-484	25	,9	Rektumresektion unter Sphinktererhaltung
5-091	21	,8	Exzision und Destruktion von (erkranktem) Gewebe des Augenlides
5-877	15	,5	Subkutane Mastektomie und hautsparende Mastektomieverfahren
5-300	9	,3	Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Larynx
5-302	9	,3	Andere partielle Laryngektomie
5-872	8	,3	(Modifizierte radikale) Mastektomie
5-273	6	,2	Inzision, Exzision und Destruktion in der Mundhöhle
5-576	4	,1	Zystektomie
5-250	3	,1	Inzision, Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Zunge
5-272	3	,1	Exzision und Destruktion des (erkrankten) harten und weichen Gaumens
5-915	3	,1	Destruktion von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut
5-277	2	,1	Resektion des Mundbodens mit plastischer Rekonstruktion
5-640	2	,1	Operationen am Präputium
5-641	2	,1	Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Penis
5-913	2	,1	Entfernung oberflächlicher Hautschichten
5-242	1	,0	Andere Operationen am Zahnfleisch
5-251	1	,0	Partielle Glossektomie
5-278	1	,0	Resektion der Wange mit plastischer Rekonstruktion
5-403	1	,0	Radikale zervikale Lymphadenektomie [Neck dissection]
5-456	1	,0	(Totale) Kolektomie und Proktokolektomie
5-485	1	,0	Rektumresektion ohne Sphinktererhaltung
5-603	1	,0	Exzision und Destruktion von Prostatagewebe
5-882	1	,0	Operationen an der Brustwarze
gesamt	2740	.	

gesamt = Anzahl der operierten Fälle (entspricht der OP-Anzahl der vorhergehende Tabelle); Mehrfachnennungen bei den OPS-Nummern sind pro Fall möglich; Prozentzahl bezieht sich auf den Anteil an den operierten Gesamtfällen

*Bei Eintritt eines Rezidivs werden weitere Therapien nicht ausgewiesen.

In-situ-Neubildungen D00-09 ohne D06 und D09.0

Systemische Therapien im ersten Jahr nach Diagnosenstellung*

Beschreibung	Typ	Anzahl	%
Medikament o. n. A.	C	4	10,0
Carboplatin, Gemcitabin	C	3	7,5
Carboplatin, Paclitaxel	C	1	2,5
Carboplatin	C	1	2,5
Tamoxifencitrat	H	23	57,5
Aromatasehemmer	H	6	15,0
Imiquimod	I	5	12,5
Nivolumab	I	2	5,0
Cetuximab	I	1	2,5
gesamt Anzahl der Fälle		40	.

gesamt = Anzahl der therapierten Fälle; Mehrfachnennungen von Therapien sind pro Fall möglich; Prozentzahl bezieht sich auf den Anteil an den systemisch therapierten Gesamtfällen

*Bei Eintritt eines Rezidivs werden weitere Therapien nicht ausgewiesen.


Überleben nach Entitäten

Diagnosejahre
2010 bis 2015

Carcinoma in situ Kolon/Rektum (D01.0 – D01.2)

Jahr	beob. Überl.	rel. Überl.	95%-KI ±	N	zens. %
1	88,7	91,7	3,8	266	,0
2	84,2	90,0	4,4	.	,0
3	79,3	87,9	4,9	.	,0
4	74,4	85,0	5,2	.	3,8
5	71,8	85,7	5,6	.	43,2

nur Ersterkrankungen




mediane Überlebenszeit
 >5,0 Jahre

Melanoma in situ (D03)

Jahr	beob. Überl.	rel. Überl.	95%-KI ±	N	zens. %
1	98,4	100,0	1,3	371	,0
2	97,6	100,0	1,6	.	,0
3	96,2	100,0	1,9	.	,0
4	93,0	100,0	2,6	.	5,9
5	92,3	100,0	2,7	.	66,0

nur Ersterkrankungen




mediane Überlebenszeit
 >5,0 Jahre

Carcinoma in situ der Haut (D04)

Jahr	beob. Überl.	rel. Überl.	95%-KI ±	N	zens. %
1	97,2	100,0	1,0	1062	,0
2	94,0	100,0	1,4	.	,0
3	89,7	100,0	1,8	.	,0
4	85,7	100,0	2,1	.	8,3
5	79,6	100,0	2,8	.	60,9

nur Ersterkrankungen




mediane Überlebenszeit
 >5,0 Jahre

Carcinoma in situ der Brustdrüse(D05)

Jahr	beob. Überl.	rel. Überl.	95%-KI ±	N	zens. %
1	98,2	98,6	1,6	271	,0
2	96,7	98,8	2,1	.	,0
3	95,9	99,1	2,3	.	,0
4	95,2	99,4	2,5	.	1,8
5	94,0	99,5	2,9	.	40,6

nur Ersterkrankungen



mediane Überlebenszeit
 >5,0 Jahre


In-situ-Neubildungen D00-09 ohne D06 und D09.0

Diagnosejahre
2010 bis 2015

Überleben gesamt, männlich

Jahr	beob. Überl.	rel. Überl.	95%-KI ±	N	zens. %
1	95,2	99,1	1,3	981	,0
2	91,7	99,5	1,7	.	,0
3	88,7	100,0	2,0	.	,0
4	84,5	100,0	2,3	.	6,8
5	80,6	100,0	2,7	.	53,4

nur Ersterkrankungen



mediane Überlebenszeit: >5,0 Jahre


Vergleichsquelle (.....)

5-Jahres-Überleben (%)

weiblich

Jahr	beob. Überl.	rel. Überl.	95%-KI ±	N	zens. %
1	97,3	100,0	,9	1163	,0
2	94,8	100,0	1,3	.	,0
3	91,7	100,0	1,6	.	,0
4	88,4	100,0	1,8	.	5,6
5	85,3	100,0	2,2	.	58,2

nur Ersterkrankungen



mediane Überlebenszeit: >5,0 Jahre

Vergleichsquelle (.....)

5-Jahres-Überleben (%)